Автор: http://www.zdorovieinfo.ru
08.11.2010 17:03 - Обновлено 14.07.2011 10:46

Шотландские ученые утверждают, что после выкидыша нет необходимости откладывать беременность на срок до шести месяцев, как того требуют рекомендации ВОЗ.

Выкидыш – самопроизвольное прерывание беременности на ранних сроках, когда плод еще не способен к жизни вне утробы матери – не такое уж редкое явление. Теоретически, беременность после выкидыша возможна в

ближайшие
несколько
месяцев
.
Но
на
практике
врачи
рекомендуют
отложить
это
событие
хотя
бы
на
полгода
.
Доктор
Сохини
Бхаттачариа
(
Sohinee
Bhattacharya
)
из
Абердинского
университета
(University of Aberdeen)
считает
, что
пора
пересмотреть
эти
рекомендации
ВОЗ.

Ее уверенность базируется на результатах ретроспективного анализа статистики сам
опроизвольных
абортов
шотландских
больниц
.
Всего
исследователи

изучили
истории
беременности
30 000
женщин
.
Результаты
этой
работы
показали
, что у
женщин
,
зачавших
ребенка
в
течение
шести
месяцев
после
выкидыша
,
меньше
вероятность
повторения
самопроизвольного
аборта
,
внематочной
беременности
,
преждевременных
родов
или
необходимости
в
кесаревом
сечении
по
сравнению
с
женщинами
, у
которых
новая
беременность

наступила
между
шестью
и
двенадцатью
месяцами
после
неудачной
. При
этом
вероятность
того
, что
малыш
при
рождении
будет
иметь
малый
вес,
также
снижалась
.

В статье, опубликованной в «Британском медицинском журнале» (*British Medical Journal*), исследов
атели отм
ечают
, что нет
необходимости
препятствовать
зачатию
после
выкидыша
,
если
не
имеется
серьезных
причин
для
задержки
,
например

,
признаков
инфекции
.

Ученые акцентируют внимание на том, что в современном мире, когда женщины в мол одости
строят
карьеру
, а
беременность
откладывают
на
более
поздние
годы
,
любая
отсрочка
уменьшает
их
шансы
родить
здорового
ребенка
.