Автор: Administrator
05.06.2008 11:57 - Обновлено 11.06.2008 08:15

По последним исследованиям - гонорея, распространенное венерическое заболевание, может удвоить риск рака мочевого пузыря у мужчин.

Предыдущие исследования уже предполагали существование подобной связи, а ученые из Гарвардской школы здравоохранения из Массачусетса обследовали состояние 51529 американских мужчин и выявили 286 случаев рака мочевого пузыря у зараженных гонореей.

«Вы нашли двойное увеличение случаев рака такого рода среди мужчин, имевших историю перенесенной гонореи», - сказал автор исследования доктор Доминик Майкауд.

Связь тем сильнее прослеживалась, чем более запущенной была форма рака, к тому же, курильщики также оказались в группе риска.

Рак мочевого пузыря находится на девятом месте по распространенности по всему миру. Курение является основной его причиной у 65% мужчин и 30% женщин по данным французского Международного агентства по исследованию рака (IARC).

«Гонорея является часто встречающейся инфекцией, вызывая местное воспаление и такие симптомы, как неполное опорожнение мочевого пузыря. Воспаление само по себе или вместе с соответствующими симптомами может оказывать ощутимое влияние на развитие рака».

Профессор Джон Той из английского благотворительного общества Исследований рака

сказал, что исследования Майкауда подтвердили подозрения, давно существовавшие у медиков: «Следующим этапом будет выяснение того, вызывает ли сама гонорея рак мочевого пузыря или здесь присутствуют какие-то другие, не выявленные факторы».

Источник: РОЛ