Автор: Administrator
03.06.2008 11:24 - Обновлено 11.06.2008 08:22

Антисептические средства на основе хлоргексидина биглюконата, мирамистина и других веществ зарегистрированы фармкомитетом России и разрешены к применению, в том числе и как средства профилактики ИППП. Среди них в аптеках можно встретить такие средства как "Интим спрей", "Мирамистин" "Хлоргексидина биглюконат 0,05%" "Цидипол" и другие. Не следует полностью полагаться на эти средства. Их применение должно быть ограничено для случаев, когда по каким-то причинам презерватив не применялся или применялся неправильно (порвался, соскочил и.т.д.). В таких случаях необходимо следуя инструкциям по применению этих препаратов провести обработку половых органов, кожи лобка, бедер, а затем ввести в мочеиспускательный канал и во влагалище.

Влагалищные средства (Фарматекс, Патентекс овал и др.) также могут быть использованы в случаях отсутствия или некорректного применения презерватива.

В заключение необходимо отметить, что существуют народные средства, которые применяются для того, чтобы избежать ИППП:
прерванный половой контакт;
мочеиспускание вслед за половым актом;
секс в морской воде;
прием антибиотиков широкого спектра действия.

Все эти методы могут лишь уменьшить вероятность заболевания, но не гарантируют от развития инфекционного процесса. А некоторые из нх, такие как использование антибиотиков, могут настолько видоизменить клиническую картину и течение болезни, что установление правильного диагноза даже в специализированном учреждении окажется сильно затруднено. При этом избавления от инфекции может и не наступить, поскольку существует понятие устойчивости и чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. Даже самые мощные антибиотики очень эффективные при одной из ИППП оказываются бессильными или даже вредными при другой.