Автор: Administrator
21.07.2008 17:19 -

Оказывается, существует различие с точки зрения биохимии между женщинами, которые испытывают тягу к представительницам своего пола и обычными женщинами, предпочитающими мужчин. Все дело в гормонах, сообщает сегодня Corriere della Sera (перевод на сайте Inopressa.ru). У лесбиянок в крови больше тестостерона и подобных соединений, и именно избыток данного андрогена, судя по всему, объясняет их сексуальную ориентацию.

Гипотеза о том, что женский гомосексуализм связан с мужскими гормонами родилась в результате исследования, проведенного в Лондонской женской клинике при Медицинском центре Халлама, британской организации, которая предоставляют услуги по искусственному оплодотворению, в том числе и лесбиянкам и неженатым женщинам. Результаты этого исследования были рассмотрены в Мадриде на ежегодном съезде Европейского общества репродукции человека и эмбриологии.

"Изучая более шестисот женщин, из которых более 250 лесбиянок, - рассказывает Рина Агравал, директор лондонского центра, - мы выяснили, что у последних в три раза чаще наблюдались поликистозные яичники, а также синдром поликистозных яичников, ведущий к нерегулярной менструации, признакам вирилизации, например, появлению волос на теле и лице, а также угрей. Обе этих болезни связаны с гормональными нарушениями и сложностью зачатия".

Новое исследование может навести на мысль о возможности лечения женского гомосексуализма, основанного как раз на лечении синдрома поликистозных яичников, однако специалисты далеки от таких идей.

Они напоминают, что в 1973 году гомосексуализм был вычеркнут из списка душевных болезней и что идея "лечения" гомосексуализма со временем превратилась в заботу о физическом и душевной здоровье этих людей, включая репродуктивное здоровье и

искусственное оплодотворение.