Автор: Administrator
25.06.2008 16:58 -

Больные раком молочной железы, страдающие от ожирения, умирают быстрее, чем их более стройные сестры по несчастью. В ходе последнего исследования один из самых опасных видов онкологии – воспалительный рак молочной железы – был отмечен у 45% пациенток, страдающих от ожирения, у 30% тучных пациенток и только у 15% пациенток с нормальным весом.

Доктор Массимо Кристофанили из Техасского Медицинского Университета Онкологического центра Андерсона считает, что чем выше вес пациентки, тем агрессивней себя ведет рак. Исследование проводилось среди 606 пациенток с раком молочной железы. Ученые вычисляли ИМТ (индекс массы тела) и то, как он влияет на распространение онкологии.

Пять лет спустя выжили 56.8% больных ожирением и 56.3% тучных женщин. У женщин нормального телосложения процент выживаемость составил 67.4%. Десять лет спустя среди полных пациенток в живых остались только 42.7% (страдающе от ожирения) и 41,8% (тучные) по сравнению с более 56% женщин нормального телосложения.

Многие исследования доказывают, что ожирение увеличивает риск смертности при нескольких типах рака. Например, избыточный вес повышает вероятность лейкемии, меланомы, рака щитовидной железы и онкологии почек.