Автор: Administrator
24.08.2008 12:47 -



Если беспокоит боль (стеснение, сжимание, жжение, тяжесть и т.д.) в области сердца или в области диафрагмы - слева, в подреберье, особенно если неприятные ощущения отдают под лопатку и в левую руку, по ее внутренней стороне.

Мучает головная боль, особенно в области затылка, сопровождающаяся ощущением "ползающих мурашек", онемения (а тем более нарушения движений) руки или ноги с одной стороны тела.

При головной боли, сопровождающейся нарастающей заторможенностью сознания, "двоением" в глазах, "мурашками", "блестящими точками" перед глазами, боли при наклоне головы вперед.

При всех ушибах головы, после которых появилась тошнота, головокружение, заторможенность сознания или психическое возбуждение.

Когда беспокоит беспрерывная боль в области лба над переносицей, усиливающаяся при постукивании по кости в этом месте. При боли в области гайморовых пазух.

При любом нагноении в области рта, даже без зубной боли, при флюсе, нагноении на лице выше линии рта, при нагноении в области носа, в ухе и на ухе.

При всех кровотечениях, при наличии крови в мокроте.

При болях и спазмах в брюшной полости. Особенно при опоясывающих болях выше пупка.

При болях в области пупка и ниже, справа от него, приступообразных, усиливающихся при движении.

При остро возникшей резкой боли, как при уколе острым предметом в живот.

При ушибах позвоночника, особенно его шейного отдела.

При болях в пояснице, односторонних, резких, отдающих в пах, не ослабевающих и в покое.

При всех ушибах в области почек.

При всех затруднениях глотания.

При любой опухоли, где бы она ни была обнаружена. Особенно при при наличии увеличенных, болезненных, тем более безболезненных, а еще серьезнее - неподвижных, спаянных и окружающими тканями лимфатических узлов.

При болях в горле, особенно сопровождающихся затруднением глотания и резко усиливающихся при глотании.

При любой незаживающей язвочке на коже, губе, в полости рта, в носу и т.д.

При необъяснимом и прогрессирующем похудении.

При изменении цвета лица - нарастающей бледности, желтизне, "серости", землистости, синюшности.

При необъяснимой прогрессирующей потере аппетита.

При нарастающей слабости мышц.

При появлении отеков ног, особенно односторонних и сопровождающихся возникновением варикоза - набухания и расширения вен.

При ухудшении зрения, особенно в одном глазу.

При преждевременном и бурном старении с потерей тонуса кожи и подкожной

клетчатки.

При депрессии и апатии.

При возникновении и нарастании хрупкости костей.

При появлении и прогрессировании тугоподвижности суставов, когда этого нельзя объяснить возрастом, или при их острой , инфекционной патологии.