Автор: Administrator
01.07.2008 14:54 -



Исследование, проведенное в Великобритании, показывает, что заместительная гормональная терапия в менопаузу (ЗГТ) значительно увеличивает риск рака яичников. Ранее британские ученые установили, что ЗГТ увеличивает риск рака молочной железы и рака матки. Согласно их данным, суммарный риск перечисленных онкологических заболеваний увеличивается при использовании ЗГТ на 63%.

Авторы новой работы, опубликованной в The Lancet, использовали материалы масштабного исследования , проводившегося с 1991 по 2005 год, и охватившего около миллиона британок, достигших менопаузы.

По данным ученых, риск развития рака яичников, а также смерти от этого заболевания, увеличивался среди женщин, принимающих гормоны, на 20%. Риск не зависел от типа ЗГТ, который использовали участницы.

Эти данные эквивалентны одному дополнительному случаю рака яичников на 2,5 тысячи, и одному дополнительному случаю летального исхода на 3,3 тысячи британок, прибегавших к ЗГТ. Риск заболевания приближался к норме в течение нескольких лет после прекращения приема гормонов.

Учитывая то, что предыдущие исследования выявили двукратное повышение риска рака груди, а также повышенный риск рака слизистой оболочки матки, связанные с ЗГТ, общее увеличение риска трех онкологических заболеваний достигает 63%, отмечают ученые.

После появления ряда исследований, посвященных побочным эффектам ЗГТ, применение гормональных препаратов после менопаузы в мире значительно

сократилось. Прием гормонов по-прежнему рекомендован при наличии медицинских показаний – тяжелых симптомов менопаузы. Лечащим врачам необходимо в индивидуальном порядке оценивать возможные риски, а также сроки прекращения терапии.

http://www.medportal.ru