Автор: Administrator
02.07.2008 17:01 -

Одним из самых распространенных женских заболеваний является эрозия шейки матки, но, как правило, оно не доставляет каких-либо неудобств женщине и впервые узнает о его наличии женщина на приеме у гинеколога.
Обычно здоровая шейка матки гладкая, бледно- розового цвета, а при эрозии она выглядит ярко-красным участком.
При этом стоит отметить тот факт, что эрозия поражает, как женщин, так и девственниц. Причинами ее появления могут быть гормональный сбой при беременности, тяжелые роды, различные механические повреждения и другие.
Но следует помнить о том, что особая роль в проявлении эрозии играют половые инфекции, такие как хламидии, уреаплазмы и прочие.
Заблуждаются и те женщины, которые считают необязательным лечение заболевания у не рожавших женщин, а тем более не правы те, что заболевание это безобидное и проходит само по себе. Если не принять мер к излечению, может развиться формирование новообразований, имеющих не только доброкачественный характер, но и злокачественный, происходит это на фоне инфицирования половыми вирусами, раннего начала половой жизни, наличия нескольких половых партнеров, абортов. Так что следует очень серьезно отнестись к проблеме лечения данного заболевания.

Как правило, эрозия не доставляет особых проблем женщине, иногда же, например, при инфицировании, могут беспокоить выделения неясного характера, при обширных эрозиях - возможны кровянистые выделения и боли после занятий сексом.
При диагностировании заболевания, перед началом лечения, врач выясняет причины его возникновения. Если эрозия носит инфекционный характер, то необходимо излечение инфекции в первую очередь.
Бытует мнение, что при обнаружении эрозии в период беременности, лечение откладывается до родов, но возможно излечиться и до их наступления, опять же опираясь на характер заболевания и причины вызвавшие его.
Методы лечения бывают разными:
-консервативные – химическая коагуляция, при которой проводится обработка шейки матки специальными медицинскими препаратами;
-хирургическое – при котором пораженные ткани удаляются хирургическим путем;
-лазерокоагуляция – обработка шейки матки проводится при помощи лазера;
-криодеструкция – использование жидкого азота;
-разноволновая хирургия;
-диатермокоагуляция – прижигание эрозии электротоком.
По материалам http://mosabort.ru./