



Возрастные изменения и интимные дефекты, такие как элонгация (удлинение) и асимметрия половых губ, являются наиболее часто встречающейся женской интимной проблемой.

Косметические операции на половых губах помогают придать им привлекательный внешний вид и устранить интимные дефекты.

Пластика малых и больших половых губ сейчас очень популярна. Используется интимная пластика также для увеличения сексуальной привлекательности. После пластики половых губ сексуальная чувствительность не только не исчезает, но и порой возрастает: после операции иногда обнажается клитор. Улучшение внешнего вида наружных половых органов приводит и к увеличению качества сексуальной жизни, так как исчезают механические затруднения, связанные с избыточной длиной малых половых губ.

Элонгация (удлинение) и асимметрия малых половых губ носят, как правило, врожденный характер. Однако более интенсивное растяжение малых половых губ может также быть следствием некоторых хронических заболеваний, сильных тракций в этой зоне или же поступления андрогенов (мужских половых гормонов).

Увеличенной считается малая половая губа, величина которой при боковом вытяжении превосходит 5 см . После проведения операции малые половые губы не выступают за уровень больших половых губ (их длина не превышает 1- 2 см ).

Операция по пластике половых губ проводится амбулаторно, под местной анестезией и

продолжается не более 40 минут. Пациентка не испытывает болезненных ощущений. Никаких рубцов не остается, рана быстро заживает, так как в этой области хорошее кровоснабжение. После операции малые половые губы становятся меньше, и остаются абсолютно симметричными.

Существуют две основные методики редукции малых половых губ. Первая из них предполагает резекцию излишне выступающей части малой половой губы линейно. В ходе такой манипуляции исчезает естественная складчатость, свойственная краям малых половых губ. Другая методика - редукция V-образных лоскутов с обеих сторон. При этой процедуре складчатость и естественная пигментация сохраняются.

При выборе методики проведения пластики половых губ принимается во внимание желание женщины, поэтому в каждом случае предполагается индивидуальный подход.

Иногда пластику малых половых губ сочетают с пластикой больших половых губ. Показанием к пластике больших половых губ является их чрезмерная величина, а также дряблость вследствие родов или возрастной атрофии. В норме большие половые губы должны прикрывать малые. Это препятствует проникновению инфекции во влагалище.

В таких случаях выполняют резекцию больших половых губ (при увеличении размеров), либо операцию липофилинга (при атрофии). Операция проводится амбулаторно, под местной анестезией, она совершенно безболезненна.

По материалам <http://zavarka.ru>