Автор: Administrator
07.07.2008 14:16 -

Почему так много женщин страдают воспалительными заболеваниями органов малого таза. Эндометрит, аднексит, сальпингит - звенья одной цепи.

Дело в том, что полость матки, маточные трубы в идеале стерильны. То есть никакая инфекция не должна проникнуть в матку, подняться в маточные трубы. Это обеспечивается несколькими защитными системами.

Первый барьер на пути инфекции - кислая среда влагалища, она уничтожает большинство бактерий. Затем - слизь шейки матки (цервикальная), которая обладает мощными антибактериальными свойствами, содержит антитела, иммуноглобулины А. Наконец полость матки. Основное условие для проникновения инфекции в матку - нарушение состава микрофлоры влагалища, снижение его защитной функции.

Степень чистоты влагалища исследуют в любой женской консультации. Результаты выдаются в цифрах: 1-2 - неплохо, 3-4 - недопустимо и нуждается в лечении!

Нарушение состава и снижение защитных свойств цервикальной слизи наблюдается как правило при дисгормональных расстройствах, нарушениях цикла.

За последние годы частота воспалительных заболеваний увеличилась, это связано с более простым отношением к полигамии, беспорядочным половым связям.

К сожалению, у большинства женщин снижен местный иммунитет влагалища, канала шейки матки. Именно поэтому воспалительные заболевания и их последствия

составляют 60-70 процентов среди общего числа гинекологических заболеваний.

Причины эндометрита
Причина эндометрита - проникновение инфекции в полость матки. Этому способствует несоблюдение правил личной гигиены, большое количество половых партнёров, общее снижение иммунитета.

Любые гинекологические вмешательства - аборты, диагностические и лечебные выскабливания, зондирования матки, гистероскопия могут стать механизмом проникновения инфекции в полость матки. Не секрет, что примерно 10 процентов абортов заканчиваются эндометритом. Инфицирование происходит не из-за нарушения каких-либо правил проведения этих вмешательств медиками, а из-за снижения местного иммунитета. При плохих мазках врач должен отказать в выполнении аборта, сначала необходимо пролечится, и только потом делать какие-либо вмешательства.

Эндометрит и внутриматочная спираль
Любая спираль, даже современная, содержащая гормоны - инородное тело, именно так она воспринимается организмом, именно на этом основан механизм её действия. Сама по себе спираль не увеличивает частоту развития эндометритов. Но её присутствие в матке может утяжелить течение болезни. При эндометрите спираль всегда удаляют.

Женщины которым установлены спирали необходимо чаще посещать гинеколога, следить за своим здоровьем. Если Вы поставили себе дорогую хорошую спираль - следите за своим здоровьем, не выбрасывайте деньги на ветер!

Симптомы эндометрита
Эндометрит всегда начинается с подъёма температуры и болей внизу живота. Чуть позже могут появиться кровянистые или гнойные выделения, боль при половом акте. Любое гинекологическое вмешательство, проведённое недавно и боли внизу живота - повод обратиться к врачу!

Обычно эндометрит начинается сразу после менструаций, родов или гинекологического вмешательства. Как и при любом другом воспалительном заболевании, течение эндометрита зависит от лечения.

В том случае если женщина решила самостоятельно справиться с болезнью, воспользовавшись советами подруг, справочником фельдшера или публикациями в интернет - дать какие-то гарантии на излечение не приходится. Лечение женских воспалительных заболеваний должно проводиться под наблюдением гинеколога.

Лечение эндометрита

Обычно за 7-10 дней грамотного лечения удаётся справиться с эндометритом. На 2-3 день после начала лечения исчезают боли, уменьшаются выделения. Тяжёлое течение болезни требует госпитализации и стационарного лечения. Во время лечения эндометрита половая жизнь противопоказана. Должен пройти один цикл, только после следующих месячных можно жить половой жизнью.

В день установки диагноза назначаются антибиотики, витамины. При наличии признаков интоксикации необходимо стационарное лечение, дезинтоксикационная терапия, капельницы.

В тех случаях, когда причина эндометрита остатки плодного яйца после неудачного аборта, при послеродовых эндометритах, когда в матке осталась часть плаценты выполняется лечебно-диагностическая гистероскопия. Во время исследования можно и поставить точный диагноз и удалить причину болезни.

Последствия эндометрита

Самое опасное осложнение эндометрита - распространение инфекции. Могут поражаться трубы и яичники, может развиться перитонит, и даже сепсис. Последствия этих осложнений - спаечная болезнь. Спайки матки, органов малого таза, кишечника. Спаечный процесс вызывает боли, может быть причиной бесплодия.

Где лечить эндометрит?

Главное - не пытаться лечить его самостоятельно. Это заболевание хорошо изучено и любой врач-гинеколог может назначить правильные препараты для лечения эндометрита. Если на фоне приёма антибиотиков улучшение не наступает, появляются новые жалобы, Вам скорее всего нужно стационарное лечение. Лучшее место - многопрофильные больницы в которых есть кафедры гинекологии.

Автор: Administrator
07.07.2008 14:16 -

Источник информации: www.aif.ru

Чтобы получить консультацию врача нашего медицинского центра, звоните по телефону (8634) 64 72 82

Стоимость услуг определяется индивидуально, исходя из необходимого объёма обследования