Автор: http://www.zdorovieinfo.ru
16.06.2010 13:12 - Обновлено 28.07.2011 07:44

Женские сексуальные дисфункции более не являются необычным явлением. Это состояние может развиться в любом возрасте, но многие женщины сообщают о сексуальных проблемах в периоды гормональных колебаний: например, после беременности или во время менопаузы.

Как пишет The Times of India , это может привести как к психологическим, так и к физическим проблемам. Некоторые симптомы включают боль во время полового контакта, низкий сексуальный

интерес
и
невозможность
испытывать
оргазм
,
поддерживать
возбуждение
во
время
сексуальной
активности
и
тому
подобное
.

Кроме того, данная проблема менее изучена по сравнению с эректильной дисфункцией у мужчин, и, следовательно, на сегодня не существует методов ее лечения. К тому же женщины часто стесняются об этом говорить. А так как уровень сексуального влечения женщины меняется от партнера

к
партнеру
,
диагностика
сексуальных
расстройств
является
непростой
задачей
.

Однако, как говорит профессор кафедры репродуктивной биологии в Университете м
едицины
в
Кливленде
(
штат
Огайо
)
Шерил
Кингсберг
, "
женщинам
не
следует
тревожиться
по
поводу
потери
сексуального
желания
больше
, чем в
случае
артрита
или
любого
другого
отклонения
,
часто
связанного
со
старением
".

"Женщины должны говорить об этой проблеме со своими партнерами и со специалистами", - заявила Кингсберг. По ее словам, "это может быть профессиональный консультант, секс-терапевт, врач, медсестра или другое доверенное лицо".

Целый ряд очень интересных новых подходов к лечению низкого сексуального желания у женщин находится в стадии разработки. По словам Кингсберг, они могут быть представлены на суд общественности уже в ближайшее время

.