



Воспалительные заболевания женской половой системы являются одними из частых заболеваний женской половины населения. Причём проявляется в разнообразие клинических симптомов.

### Воспалительные заболевания женской половой системы

Воспалительные заболевания женской половой системы встречаются в основной группе женщин репродуктивного возраста. Основными причинами развития воспалительных заболеваний являются понижение иммунитета к условно – патогенной флоре, заражение половой инфекцией, смена полового партнёра, количество аборт. Во всех странах мира отмечен резкий рост воспалительных заболеваний женской половой системы. Причин здесь множество: и возрастающая миграция среди населения, а также раннее начало половой жизни, низкая осведомленность населения о методах предохранения от инфекций. Больные с острыми воспалительными заболеваниями женской половой системы составляют около 70 % всех гинекологических больных, которые по той или иной причине обратились в различные лечебные учреждения за медицинской помощью.

### Воспалительные заболевания

По статистике во всём мире в последние годы отмечено повышение частоты воспалительных заболеваний репродуктивной системы женщины. В России за последние 7 лет заболеваемость воспалением половых органов увеличилась на 40 % и продолжает набирать рост. Особое место среди гинекологических заболеваний в связи с прогрессирующим ростом занимает хроническое воспаление придатков матки. Воспаление придатков матки возникает преимущественно у женщин детородного возраста. Характеризуется длительным, затяжным течением, нередко приводит к развитию стойкого болевого синдрома, частым расстройствам менструальной фазы. Воспалительные заболевания. Также нередко приводит к нарушениям репродуктивной и сексуальной функций, вторично вовлекает в патологический процесс нервную, сердечно-сосудистую, эндокринную и другие системы организма. В результате воспалительных заболеваний служит развитие тяжелого деформирующего процесса в маточных трубах, обуславливающего трубное бесплодие.

Этиология воспалительных заболеваний органов малого таза

К ним относятся все инфекции, передающихся половым путём, внутриматочные средства (ВМС), снижение иммунитета, оперативные вмешательства на женскую половую систему, диагностические выскабливание, аборты. Воспалительное заболевание женской половой системы по статистике занимают первое место среди всех гинекологических заболеваний. Около 40—45% случаев в патологический процесс одновременно могут вовлекаться мочевые органы. Впервые это обнаружил Stadffeld в 1862 г. Как правило, верхние мочевые пути и мочевой пузырь поражаются при банальной или туберкулезной инфекции в половых органах. Нередко вовлекается вся мочеполовая система, мочеиспускательный канал, преимущественно гонорейной или трихомонадной инфекцией. Когда ее источником является кольпит, бартолинит и эндоцервицит. Замечено, что при этом патогенная флора в половых и мочевых органах часто одинакова. Развитию воспалительных заболеваний и их хроническому течению способствует не только заражение от больного, но и недостаточность приспособительных реакций организма на инфекцию, возникшая в детстве. В зрелом возрасте это могут вызывать - нейроэндокринные расстройства и другие заболевания, дающие осложнения на половую сферу. В большинстве случаев хронические воспалительные заболевания у женщин протекает без ярко выраженной клиники. Подумаешь, небольшой зуд, жжение или выделения, запах. Само пройдет, - решают большинство женщины, и заболевание переходит в хроническую форму. А ведь любой хронический процесс считается уже серьезной угрозой организму, приводящей к бесплодию, внематочным беременностям, тазовым болям, причиняющим страдания и нередко приводящим даже к инвалидизированию женщин. Ведь влияние любого провоцирующего фактора снова может вызвать заболевание. Вот почему малейшее ухудшение состояния должно быть немедленным поводом обращения к специалисту. Воспалительные заболевания органов малого таза (ВЗОМТ) – это инфекции верхнего отдела женской половой системы. К ВЗОМТ относят эндометрит, миометрит, сальпингит, оофорит, пельвиоперитонит. Частота встречаемости заболевания встречается у 3-5% сексуально активных женщин. В России ежегодно более чем у половины женщин диагностируют ВЗОМТ, 60% из них необходимо лечение в стационаре. Преобладающий возраст - 15-29 лет.