Автор: http://www.zdorovieinfo.ru
05.09.2011 12:50 - Обновлено 16.05.2018 11:42

*Новое – не всегда признак хорошего. А особенно если речь идет о новообразования в организме. Женские яичники подвержены повышенному риску новообразований. Некоторые из них могут сами рассосаться со временем, а какие-то удаляются только хирургическим путем.*

Консультация www.маммолог.онлайн

Консультация www.венеролог.онлайн

ЧИТАЙ ТАКЖЕ - **Клиника предлагает спектр услуг**

Виктор Миронов/»Здоровье инфо» ЧИТАЙ ТАКЖЕ - Боли, характерные для разрыва кисты

яичника

**Что такое киста?**

Кистой называются заполненные жидкостью образования, которые могут образовываться в яичниках, чаще всего у женщин детородного возраста. Существует несколько различных типов кист. Наиболее распространенная – функциональная киста. Она образуется во время овуляции, в том случае, если возникают затруднения с выходом яйцеклетки. Существуют

и
другие
виды
кист
:

*Поликистозные яичники.* В яичниках образуются многочисленные небольшие фоллику
лы
.

*Эндометриоз.* Клетки внутреннего слоя матки разрастаются в яичники. Болезненное
заболевание
, при
котором
могут
возникнуть
проблемы
с
фертильностью
.

*Дермоидная киста.* Этот вид кисты содержит ткани, нехарактерные для яичников (во
лосы
,
сальные
железы
).

ЧИТАЙ ТАКЖЕ - Новая программа диагностики патологии молочной железы

**Как образуются опухоли?**

Если опухоль не является раковой, то ее называют доброкачественной. Различают с
ледующие
виды

опухолей
:

*Эпителиальная опухоль яичника.* Это самый распространенный вид опухолей, они об
ычно
возникают
на
поверхности
яичников
.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ - Рак яичников. Часто задаваемые вопросы

*Герминогенная опухоль яичников.* Эти опухоли развиваются в первичных зародышев
ых клетках.
Как
правило
, они
доброкачественные
,
хотя
встречаются
и
исключения
.

*Стромальная опухоль.* Такие опухоли развиваются в клетках, которые производят же
нские
гормоны
.

Причины рака яичников доподлинно не известны, однако можно обозначить некотор
ые факт
оры
риска
:

- возраст (после менопаузы возникает больший риск);
- курение;
- ожирение;
- отсутствие детей.

Препараты, способствующие зачатию:

- заместительная гормональная терапия;
- наследственность.

**Симптомы кисты и опухолей**

Киста, особенно на первых этапах болезней, проходит бессимптомно. Проблемы она вызывает в случае разрыва или кровотечения. Симптомы кисты и опухолей могут включать в себя:

- боли и вздутие брюшной полости;
- затрудненное мочеиспускание или частые позывы к нему;
- тупая боль в нижней части спины;
- боль во время полового акта;
- болезненные менструации и аномальные кровотечения;
- увеличение веса;
- тошнота или рвота;

- потеря аппетита.

## Диагностика

Большинство подобных новообразований может быть выявлено во время гинекологического осмотра. Большинство из них доброкачественные, но из-за риска рака (особенно у женщин после менопаузы )все они тщательно проверяются. Анализы могут включать в себя УЗИ, резонансную томографию, лапароскопию и оценку уровня гормонов.

**Как это лечится**

Кисты нередко просто рассасываются, так что врач вполне может рекомендовать «внимательное ожидание». Ожидание будет включать в себя регулярные проверки, не реже, чем раз в три месяца.

Боль могут облегчить противозачаточные таблетки. Они задерживают овуляцию и, таким образом, препятствуют развитию некоторых видов кисты.

В некоторых случаях применяется **хирургическое вмешательство**:

*Лапароскопия.* На животе делается маленький разрез, в который вводится инструмент для удаления

кисты
. Его,
обычно
используют
для
удаления
мелких
кист
.

*Лапаротомия* предполагает большой разрез на животе. Таким образом удаляются кру
пные
кисты
и
опухоли
, в том
числе
раковые
.

Запись на консультацию по телефону: 8 (8634) 36 46 01 в Таганроге

Клиника работает ежедневно.

Часы приема врачей – с 10.00 до 15.00.

Суббота - с 10.00 до 13.00

E-mail: klinika@vvi-klinika.ru

Лицензия № ЛО-61-01-001709