Автор: http://www.zdorovieinfo.ru
28.05.2010 13:52 - Обновлено 25.07.2011 11:07

Ученые выяснили, что одним из методов борьбы с пандемией СПИДа может стать профилактика вируса папилломы человека (ВПЧ), поскольку носители этой инфекции гораздо чаще других оказываются еще и ВИЧ-инфицированными.

В ходе изучения этих двух заболеваний, американским ученым удалось обнаружить взаимосвязь между ними. В исследовании участвовали более 2.000 мужчин из Кении, в возрасте от 18 до 24 лет, ведущих активную сексуальную жизнь,

ВИЧ-отрицательных
и
которым
не
было
сделано
обрезание
. В
начале
наблюдения
их
проверили
на
наличие
вируса
папилломы
человека
.
Повторная
проверка
была
проведена
спустя
24
месяца
, а у
многих
– еще и
через
42
месяца
наблюдений
.

Как показали тесты, почти у половины (более 1000) мужчин была инфекция ВПЧ на к
оже
пениса
.
Спустя
42
месяца
,
почти
у 6%

из
них
обнаружился
и ВИЧ. Для
сравнения
,
из
тех, кто
не
имел
ВПЧ,
ВИЧ-положительными
оказались
только
около
4%.
По
словам
автора
исследования
доцента
эпидемиологии
в
Школе
глобального
общественного
здравоохранения
им
.
Гиллингса
при
Университете
Северной
Каролины
в
Чапел-Хилл
(
Gillings
School of Global Public Health at the University of North Carolina at Chapel Hill)
Дженнифер
Смит
,
даже
с
поправкой
на

обрезание
,
герпес
и
другие
факторы
риска
сексуального
и
социодемографического
характера
,
вероятность
заражения
ВИЧ
среди
тех
пациентов
, у
которых
во
время
первичной
проверки
был
обнаружен
ВПЧ,
можно
считать
значительно
повышенной
по
сравнению
с
остальными
мужчинами
.

Как сообщается в выпуске «Журнала инфекционных заболеваний» (Journal of Infectious Diseases
)
от
1
июня

, при
подтверждении
этих
данных
новыми
исследованиями
, в
рамках
борьбы
со
СПИДом
планируется
проводить
профилактику
ВПЧ, для
некоторых
видов
которого
уже
существуют
вакцины
.
Возможно
,
вакцинация
молодых
мужчин
до
начала
половой
жизни
приведет
к
замедлению
распространения
ВИЧ-инфекции
,
считают
специалисты
.